

Es de advertir, que los capullos de la región valenciana son de la clase más excelente de cuantos se producen en España. La seda es más fina y resistente y rinde más por unidad de peso que la de Murcia, aunque no mucho. La causa hay que atribuir-la á que en la región valenciana se cría con más esmero y luego se vende el capullo á las filaturas limpio y estriado. Hé aquí la razón del por qué los capullos se pagan un poco más caros en Valencia que en Murcia.

Lo mismo que sucede en esta última zona ocurre en la primera, respecto de la filatura. Los cosecheros venden los capullos á las fábricas de hilados, no haciendo por sí esta última operación como ocurría antiguamente.

ZONA DE ZARAGOZA—TORTOSA

Es en importancia la tercera zona sericícola de España. Comprende toda la cuenca del Ebro, en su margen derecha á izquierda; su parte más extensa está comprendida entre Mequinenza y Morella; nace desde el Burgo y llega hasta Tortosa, comprendiendo pueblos de alguna importancia, como Alcañiz y Mora de Ebro.

Allí se ha criado mucha seda en la antigüedad, pero hoy la decadencia ha llegado á lo sumo. No existe en dicha zona ninguna filatura; la seda es de buena clase y los rendimientos son variables en unos pueblos respecto de otros, efecto del mayor ó menor esmero en la crianza, cosa que tanto influye para obtener buena cosecha.

Se dá en esos parages muy buena hoja de morera: la flora se retarda unos 35 días respecto de Morella, por lo que la cosecha se recolecta después.

La producción de capullo en la zona que nos ocupa, ha sido en el año actual de 30.000 kilogramos, cuya cosecha podría multiplicarse con poco esfuerzo. Hay allí mucha pobreza en los agricultores; la baja en los precios de los vinos los tiene perdidos y la cría de los gusanos de seda, habría de aliviar mucho la situación aflictiva que están sufriendo.

Faltan moreras, que es lo que ocurre en toda España.

ZONA DE GRANADA

Apenas considerar la cosecha que actualmente se obtiene en

